M.rs il y a quelque tems que m. Guignon eleve en chirurgie, presenta à l'academie un instrument pour faire l'operation du phimosis. cet instrument fut jugé imparfait, mais l'idée qui en parut bonne fit que nous nous proposames au moyen de quelques corrections de le rendre un des plus commodes qui aient été imaginés en ce genre.

Cet instrument est composé de deux branches, et d'une lame tranchante. Les deux branches sont à anneau, elles se traversent l'une dans l'autre en se croisant, Elles sont fixees par un clou fraisé en dedans. leurs extremité est differemment construite, la superieure est plus prolongée que l'inferieure, elle decrit une courbe; l'inferieure est droite, elle a la forme d'une sonde; La superieure porte la lame dont le tranchant est droit, l'obliquité de la lame avec ~~cette~~ la branche forment un angle aigue. cette branche est terminée par un tenon a queue d'aronde, qui s'encastre dans une entaille qui est au talon de la lame du côté du tranchant, une espece de chape ou chasse embrasse exactement les deux pieces, son talon qui est plus étroit que le reste de la chape, s'engage dans une autre entaille, qui est au dos de la lame. Enfin ces trois pieces sont traversées, et maintenues solidement, par deux vis

m. Guignon donne a son instrument, l'avantage de pouvoir être porté aisément, entre le gland et

ARC 32 d. 4 n° 126
ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

le prepuce jusqu'à la base du gland, ~~sans aucun inconvenient afin d'y étendre son incision~~
afin d'y étendre l'incision sans inconvenient, et sans aucun embarras. En effet il n'est question ici, que d'introduire la branche inferieure comme une sonde, elle a à son extremité un enfoncement qui est pratiqué, pour recevoir la pointe de lame placée en dehors, dans lequel elle s'engage après avoir percé le prepuce, de façon qu'alors le malade ne sçauroit par ses mouvemens deranger les desseins de l'operateur; cette operation ainsi executée me paroît plus simple, plus prompte, et plus exacte, que lors qu'on porte entre ces deux parties, une lame toute nue ou accompagnée d'une sonde, dont le volume ne sert qu'à accumuler les difficultés

il me semble que m. Guignon, en voulant prolonger son incision jusqu'à la base du gland, ne fait que suivre les preceptes etablis par presque tous les auteurs; ils voulant qu'avant de faire l'operation, que l'on égalise les membranes du prepuce, qu'ensuite on le tire a soi afin d'en inciser d'avantage. que l'on place son incision a la partie superieure, en l'étendant jusqu'à la base du gland. que l'on incise sur le lieu des chancres s'il y en à &c

mais si l'on entreprend d'égaliser les membranes du prepuce lors qu'elles sont enflammées, outre l'impossibité de le faire, l'on cause au malade des douleurs très vives; si l'on tire le prepuce a soi au lieu

de le porter avec force sur le corps de la verge, l'on s'expose a découvrir les corps caverneux. si on l'incise jusqu'à la base du gland, cela ajoute inutilement une difformité fort desagreable a l'operation. En faisant l'incision sur le lieu des chancres. s'ils sont au prepuce, ce qui n'a pas été distingué, elle rend leur curation plus opiniatre, et l'inflammation fera plus de progrés. Enfin si l'on joint a tous ces preceptes la methode reçue, de panser le prepuce incisé dans sa situation, au lieu de l'etendre sur le corps de la verge, l'on névitera point les gonflemens, et l'inflammation qui succedent, consequemment la douleur. accidens qui retardoront la guerison de cette partie

En se rapprochant du caractere de la maladie, et de la configuration de ces parties, je crois que l'on s'assurera de l'inutilité de tous ces preceptes. Le phimosis tant naturel ~~qu'artificiel~~ qu'accidentel, n'est produit que par le resserrement du ~~prepuce~~ bord du prepuce, et d'une partie de la membrane interne or les fibres de cette membrane se rassemblent pour se reunir au filet de la verge; on peut donc presumer qu'en plaçant la division du prepuce vers cette partie, plutôt qu'à la superieure, on parviendra a degager le gland; avec la precaution de tirer de la membrane externe vers le pubis le plus que l'on pourra, parceque l'on en coupera toujours assés. Le gland ayant moins d'étendue dans cet endroit, il n'y aura point de comparaison pour la difformité. mais quand même l'on feroit l'incision a la partie superieure, il n'y a point de necessité de la prolonger jusqu'à la base du gland. ~~a~~ par l'observation de ces regles le prepuce tendu, sera incisé avec moins de douleur, et plus de precision. Duprouy

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

No. 126